

PROTOCOLO DE TRATAMENTO PARA ANGINA DE LUDWIG: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Álvaro Farias Auad Queiroz

Discente do Curso de Odontologia do Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS).
E-mail: afaq1188@gmail.com

Rebeca Neneza Dias Barboza

Discente do Curso de Odontologia do Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS).

Gabriel Silva Andrade

Discente do Curso de Odontologia do Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS).

Breno Souza Benevides

Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS).
E-mail: brenosbenevides@gmail.com

RESUMO

A Angina de Ludwig foi descrita pela primeira vez em 1836 por Wilhelm Friedrich Von Ludwig, como uma celulite gangrenosa progressiva rápida e frequentemente fatal ou fascíte necrosante com envolvimento bilateral dos espaços sublingual, submental e submandibular, podendo disseminar-se pelo mediastino. Por isso, requer diagnóstico precoce e manejo agressivo. Os principais fatores causadores incluem infecções dentárias, cárie dentária e pericoronarite. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre Angina de Ludwig, abordando sua etiologia, diagnóstico e a conduta de tratamento. Foi realizada uma busca na plataforma PubMed, utilizando os descritores cadastrados no decs: “Ludwig's Angina”, “Diagnosis” e “Drainage” unidos pelo operador booleano “AND”. Foram incluídos estudos datados de 2012 a 2022, publicados na língua inglesa, totalizando 23 artigos. Os critérios de exclusão utilizados foram revisões de literatura e estudos que não se encaixavam com o tema, foram selecionados 8 artigos, após leitura crítica dos títulos e resumos, que tinha correlação com o tema proposto. O protocolo de tratamento principal deve consistir a manutenção das vias aéreas, antibioticoterapia adequada, incisão e drenagem, remoção da causa primária, adequada hidratação e suporte nutricional. Dessa forma, conclui-se que a Angina de Ludwig é uma celulite aguda grave que envolve áreas viscerais do pescoço, no qual requer uma equipe multidisciplinar, incluindo conduta cirúrgica e terapia intensiva. O prognóstico depende do reconhecimento clínico precoce e do tratamento cirúrgico.

Palavras-chave: Angina de Ludwig; Diagnóstico; Drenagem.

Área temática: Cirurgia Buco-maxilo-facial.